

BLINK -tutkimus

Tutkimuksen tarkoitus:

Räpäysheijastetutkimuksella selvitetään rakenteellisia ja toiminnallisia häiriöitä kolmoishermon eri haarojen, aivorungon ja kasvohermon alueella. Räpäysheijaste saadaan esiin kosketusärsykkeellä kolmoishermon hermottamalta ihoalueelta.

Valmistautuminen:

Meikkiä ja muita ihovoiteita tulisi välttää, sillä ne hankaloittavat elektrodien pysymistä.

Tutkimuksen kulku:

Tarraelektrodit asetetaan silmäkulmiin ja nenänpieliin.

Stimulaatioelektrodi sijoitetaan oireista riippuen kolmoishermon jonkin haaran päälle. Ärsykkeenä käytetään pieniä sähkösysäyksiä.

Tutkimukseen kuluva aika on n. 1 tunti.

Kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri antaa lausunnon tutkimustuloksesta. Lausunto toimitetaan lähettävälle osastolle tai poliklinikalle.

Yhteystiedot:

Mikäli ette voi saapua tutkimukseen sovittuna aikana, pyydämme ilmoittamaan hyvissä ajoin kliinisen neurofysiologian osastolle puh. 06-323 2531.