

Cholesteatomoperation (pärlväxt) - hemföreskrifter efter operationen

Varför operation:

- kronisk öroninflammation
- hål på trumhinnan
- rinnande öra

Allmänt om operationen:

- görs för att få bort sjukdomen och att förebygga att den inte kommer på nytt
- görs i narkos och via bäddavdelning
- Du stannar på avdelningen 1-2 dagar beroende på hur Du mår

Skötselråd:

- under operationen sätts tamponer i örongången. Tamponerna får vara kvar i ca. 7 dagar
- örat skyddas med förband den första veckan och under den tiden får Du ej tvätta håret
- skydda örat för vatten (tills annat sägs)
- undvik att snyta Dig och håll inte för näsan vid nysning
- sjukledigt är 3-4 veckor, undvik under den tiden fysisk ansträngning, idrott och bastu
- Du kan v.b. ta värkmedicin som passar Dig

Eftergranskning:

Efter operationen kan det komma blodblandat sekret från örat. Övergående svindel och värk kan förekomma.

Första kontrollen sker på öronpolikliniken 7-10 dagar efter operationen. Då tas styggen och tamponerna bort, samtidigt fylls örongången med antibiotikasalva.

Efter 2 veckor är följande kontroll, då sugsalvan tas bort.

Hörseln kontrolleras första gången efter ca. en månad.

Fortsatta kontroller sker enligt överenskommelse.

Kontakta sjukhus/läkare

Efter operationen kan det komma blodblandat sekret från örat. Övergående svindel och värk kan förekomma.

Om ovannämnda symtom tilltar eller om Du får feber, kontakta öronpolikliniken vardagar kl 7-15, tel. 06-323 1372, övriga tider dejorpolikliniken, tel. 06-323 1311.

Gott tillfrisknande !