

CYSTISTAT-HUUHTELU

Toimenpiteen tarkoitus

Virtsarakon seinämän vahvistaminen suojaavalla aineella.

GAG (glykosaminoglykaani) on luultavasti se aine, joka muodostaa suojaavan kerroksen virtsarakon seinämään virtsassa olevia erilaisia haitallisia aineita vastaan. Cystistat-lääkettä käytetään, kun on tilapäinen tarve täydentää GAG-kerrostuman puutetta tai vajausta virtsarakossa. Oireena voi olla esimerkiksi kystiitti.

Valmistautuminen

Ennen huuhtelua tyhjennetään virtsarakko virtsasta.

Toimenpiteen kulku

Lääkeaine laitetaan virtsarakkoon katetrin avulla. Parhaan lopputuloksen saamiseksi lääkkeen tulisi olla rakossa ainakin 30 minuuttia tai mahdollisimman pitkään.

Hoito toistetaan viikoittain 4 viikon ajan ja kuukausittain 2kuukauden ajan. Tarvittaessa hoitoja voidaan jatkaa pidempään.

Huomioitavaa

Ensimmäisten hoitokertojen jälkeen on melko tavallista, että virtsavaivat jopa voimistuvat hetkeksi. Oireet helpottuvat tai häviävät huuhteluita jatkettaessa.