

Diffusionskapacitet diagnostisk undersökning

Vi har reserverat tid åt dig till Vasa centralsjukhus, klinisk fysiologiska avdelningen.
Huvudbyggnaden 1.vån. bakom provtagningslaboratoriet, **C1 rum 13.**
Var god och sätt dig utanför rummet. Ni kallas in med namn.

Om nämnda tid inte passar dig, ber vi dig kontakta remitterande poliklinik.

Om undersökningen

Vid undersökningen mäts lungornas funktionsförmåga. Undersökningen räcker ca 45 - 60 minuter.

Förberedelser

Du får inte dricka te, kaffe, eller coladrycker och andra uppiggande energidrycker två timmar före undersökningen.

Du får inte röka fyra timmar före undersökningen, eller dricka alkohol 24 timmar före undersökningen.

På undersökningdagen ska du undvika kraftig ansträngning, inandning av kall luft och kraftiga måltider, men ändå inte vara oäten.

Undersökningen görs tidigast två veckor efter botad "flunsa", bihåleinflammation, eller annan luftvägsinfektion, och två veckor bör ha förflutit efter avslutad antibiotikakur.

Du bör sitta 15 min före undersökningen för att andningen skall stabilisera sig, så kom till undersökningen i god tid.

Använd inte starka parfymer eller rakvatten när du kommer till undersökningen !

Medicinering

se bilaga.

Välkommen !

uppdat. 04.07.2011

Före den diagnostiska lungfunktionsundersökningen skall du vara utan följande mediciner, åtminstone den nämnda tiden.

1 Dygn	<ul style="list-style-type: none"> ● Airomir ● Adrenalin medihaler ● Atrodual ● Atrovent ● Atrivent comp ● Berotec ● Buventol 	<ul style="list-style-type: none"> ● Bricanyl ● Efedrin ● Ipramol ● Ipraxa ● Ipratropiumbromid ● Lumudal ● Rinexin 	<ul style="list-style-type: none"> ● Salbutamol ● Salbuvent ● Salipra ● Tilade ● Ventilastin ● Ventoline ● Ventox
-----	-----	-----	-----
2 Dygn	<ul style="list-style-type: none"> ● Innovair ● Formoterol ● Foradril 	<ul style="list-style-type: none"> ● Oxis ● Seretide 	<ul style="list-style-type: none"> ● Serevent ● Symbicort
-----	-----	-----	-----
3 Dygn	<ul style="list-style-type: none"> ● Accoplate ● Aminocont ● Euphyllin ● Nuelin depot 	<ul style="list-style-type: none"> ● Montelukast ● Retafyllin ● Theo-Dur ● Theofol 	<ul style="list-style-type: none"> ● Theofol comp ● Singulair ● Alla hostmediciner
-----	-----	-----	-----
4 Dygn	<ul style="list-style-type: none"> ● Spiriva 		
-----	-----	-----	-----
5 Dygn	<ul style="list-style-type: none"> ● Aerinaze ● Aeries ● Alzyr ● Atarax ● Benadryl ● Cetirizin ● Cirrus ● Clarityn ● Clarityn-s ● Clarinase ● Duact ● Disofrol 	<ul style="list-style-type: none"> ● Fexofenadine ● Gardex ● Heinix ● Histanova ● Histec ● Kestine ● Levazyr ● Levocetirizin ● Lomfast ● Loratidin ● Lunerin ● Netoxef 	<ul style="list-style-type: none"> ● Postafen ● Rinomar ● Senirex ● Semprex ● Siterin ● Tinaroc- combi ● Teldanex ● Telfast ● Tuulix ● Vertipam ● Xyzal ● Zyrtec

Vid diagnostiska undersökningar rekommenderas en paus med Glukokortikoiderna/Kortikosteroiderna på fyra veckor. Läkaren som begär undersökningen ger instruktioner. I fall det är frågan om vårdkontroll, finns ingen medicinbegränsning.

Glukokortikoider/Kortikosteroider:

Aerobec, Alvesco, Asmanex, Beclomet, Becotide, Budenofalk, Budesonid, Cortivent, Dexametason, Entocort, Flixotide, Hydrocortison, Hydrokortone, Medrol, Novopulmon, Prednisolon, Prednison, Pulmicort, Solomet.

Nässpray används som vanligt.

Välkommen!

uppdat. 18.11.2011