

Dränering av bihålorna (Antrostomi)

Ingreppet

Under operationen görs vanligen en ny dräneringsöppning mellan näsmusslan och bihålorna. Ingreppet utförs i praktiken bara hos barn. Barnet sövs före ingreppet, som vanligtvis görs via näsborrarna.

Konvalecens

P.g.a. blödningsrisken bör man undvika att snyta sig, samt undvika kraftig ansträngning och bastubad under en veckas tid efter operationen. Under operationsdagen behöver barnet vila och vara under uppsikt av en vuxen person. Barnet får röra sig i den mån smärtan tillåter. Barnet bör vara borta från dagvård/skola 2-3 dygn efter ingreppet.

Sårvård

Det kan komma blod, blodblandad vätska eller gulaktigt sekret från näsan. Man bör använda koksalt droppar eller –spray för att återfukta näsans slemhinnor (t.ex. Humidose)

Smärtlindring

Det är bra att ta värkmediciner regelbundet i 1-4 dygn efter operationen och sedan vid behov.

Paracetamol

Anti-inflammatorisk värkmedicin

Eftergranskning sker vid behov på öronpolikliniken 2-4 veckor efter ingreppet.

Tag kontakt

Öron-, näsa-, halspolikliniken kl.07.00-15.00 tel. **(06) 323 1372**
Dagkirurgiska enheten A2 vardagar 07.00-17.00 tel. **(06) 323 1552**
Gynekologiska-, allmänkirurgiska avdelningen A5 **(06) 323 2092**
Dejourpolikliniken/Akuten andra tider tel. **(06) 323 1311**

Vi önskar ett gott tillfrisknande!