

Endoskopi av urinblåsan (cystoskopi)

En endoskopi av urinblåsan görs bl.a. **om patienten har besvär med urineringen eller om blod ses i urinen**. Den ger information om blåsväggarna samt blåsans volym. I samband med undersökningen kan man ta provbitar och göra små ingrepp.

Ingrepp

Ingreppet sker vanligen **under ryggbedövning**. Vid behov kan man komplettera med hjälp av avslappnande medicin eller smärtmedicin. Man för in den rörformade kameran och instrument (cystoskopet) via urinröret och vidgar urinblåsan med hjälp av vätska. Ingreppet **tar ca. 15 minuter**.

Konvalescens

Efter ingreppet kan man de första urineringsgångerna uppleva sveda och se litet blod eller koagel i urinen. **För att skölja blåsan rekommenderas ett vätskeintag på 1,5-2 liter under det första dygnet, vilket också skyddar mot urinvägsinfektion**. En eventuell infektion ger sig till känna inom en dryg vecka. Om besvären fortsätter efter några dagar kan man ta kontakt med sin hälsocentral.

Smärtlindring

I allmänhet behövs ingen smärtmedicinering hemma, men **vid behov kan man använda receptfria värkmediciner**:

Paracetamol

Anti-inflammatorisk värkmedicin

Andra mediciner

Sjukledighet ordinerar för ingreppsdagen.

Tag kontakt

Den gynekologiska polikliniken vardagar kl. 14.00 - 15.00 tel. **(06) 323 2012**,

Dejourpolikliniken / akuten under övriga tider **(06) 323 1311**,

Den dagkirurgiska enheten vardagar kl. 7.00 - 17.00 tel. **(06) 323 1552**,

Den egna hälsocentralen eller arbetshälsovården

Vi önskar gott tillfrisknande!