

Eturauhasen laserhöyläys (Green laser, PÄIKI)

Taustaa

Ikään liittyvää eturauhasen kasvua sanotaan hyvänlaatuiseksi liikakasvuksi. Eturauhanen ympäröi virtsaputkea virtsarakon alapuolella, joten sen kasvaessa virtsaputki ahtautuu. Tämä hidastaa rakon tyhjentymistä.

Toimenpide

Toimenpide tehdään tähytysleikkauksena virtsaputken kautta. Lasersäde kohdistetaan liikakasvaneeseen eturauhaskudokseen. Eturauhaskudos höyrystyy ja poistuu huuhteluveden mukana. Toimenpide kestää 1-2 tuntia. Perinteiseen höyläykseen verrattuna laserhöyläyksen etuina ovat niukka vuoto ja vähäinen kipulääkkeen tarve, mikä mahdollistaa kotiutumisen saman päivän aikana. Toimenpide tehdään joko selkäydinpuudutuksessa tai nukutuksessa.

Toipuminen

Virtsaa voi olla aluksi veristä ja verihyytymiä voi muodostua virtsateihin. On suositeltavaa **juoda runsaasti (2-3 l) muutaman ensimmäisen päivän ajan ja virtsata usein**. Muutaman viikon ajan voi esiintyä tiheävirtsaisuutta, virtsaputkessa ja rakossa saattaa tuntua kirvelyä. Joskus virtsa voi muuttua veriseksi uudelleen 2-4 viikon kuluttua rupien irrotessa leikkausalueelta. Tämä ei ole vaarallista, jos virtsa kulkee hyvin.

Yhdyntää tulisi välttää kahden viikon ajan. Osalle potilaista jätetään rakkoon [virtsatiekatetri leikkauksen jälkeen, sen voi itse poistaa seuraavana päivänä \(tai erillisen ohjeen mukaan\) kotona](#).

Toimenpidepäivänä on hyvä levätä mahdollisimman paljon. Leikkauksen jälkeisenä päivänä voi liikkua voimien mukaan, mutta ponnisteluja ja tärinää tulee välttää kahden viikon ajan (esim. traktorilla ajo, pyöräily). Suihkussa voi käydä leikkauksen jälkeisenä päivänä, saunaan ja uimaan voi mennä kahden viikon kuluttua.

[Ummetusta tulee ennaltaehkäistä ja hoitaa toimenpiteen jälkeen.](#)

Kivunhoito

Kipulääkkeitä on **hyvä ottaa säännöllisesti 1-4 vrk:n ajan** ja sen jälkeen tarvittaessa:

Parasetamoli

Tulehduskipulääke

Muut lääkkeet

Sairausloma on 2-3 viikkoa työn luonteesta riippuen.

Yhteydenotot

Mikäli paranemisessa ilmenee **ongelmia**,

- esim. virtsa muuttuu verisemmäksi ja hyytymät haittaavat virtsaamista,
- virtsantulo lakkaa ja rakko tuntuu täydeltä,
- ilmenee lisääntyvää kirvelyä ja tihentynyttä virtsaamisen tarvetta sekä lämmön nousua (nämä saattavat olla infektion oireita),
- virtsankarkailu jatkuu yli 1-2 kuukautta

tulee ottaa yhteys terveyskeskukseen tai hoitavaan yksikköön:
Kirurgian poliklinikka, uroterapeutti maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 8.00–10.00 **(06) 323 1537**,
Päiväkirurginen yksikkö A2 arkisin klo. 07.00 - 17.00 puh. **(06) 323 1552**,
Päivystyspoliklinikka muuna aikana puh. **(06) 323 1311** tai
Oma terveyskeskus tai työterveyshuolto

Toivotamme hyvää toipumista!