

Diagnostinen helicobacter-pylori tutkimus

Sinulle on varattu aika Vaasan keskussairaalaan, kliinisen fysiologian osastolle.

Päärakennus, 1.kerros, näytteenoton takana, **C1 huone 10.**

Ole hyvä ja istu alas odottamaan. Hoitaja kutsuu nimellä sisään.

Mikäli mainittu aika ei sovi, ole hyvä ja ota yhteyttä! Puh: 323 2551.

Tutkimuksen kuvaus

Tutkimuksella selvitetään mahdollinen helikobakteeritartunnan olemassaolo mahalaukussa.

Tutkimuksessa puhallat näytepussiin, ensin n.s. o-näyte. Sen jälkeen saat juoda lasin vettä, joka sisältää vaarattoman tutkimusaineen. 30 minuutin kuluttua puhallat uudelleen toiseen näytepussiin jonka jälkeen tutkimus on valmis.

Tutkimuksen jälkeen voit syödä normaalisti.

Esivalmistelut

Ennen tutkimusta sinun on oltava 6 tuntia ilman ravintoa

Kahvi, tee ja kolajuomat ovat kiellettyjä tutkimuspäivänä (6 tuntia ennen tutkimusta).

Alkoholia ei saa juoda 12 tuntia ennen tutkimusta.

Tupakointi on kielletty 1 h ennen tutkimusta.

Älä käytä parfyymejä tai hajuvettä kun tulet tutkimukseen.

Lääkkeet

Katso liite

Liite:

Ennen diagnostista *Helicobacter pylori*-tutkimusta tutkittavan tulisi olla ilman seuraavia lääkkeitä vähintään mainittu aika:

2 veckor

Antibiotika

- *alla*

Magmediciner

- *Gasterix*
- *Gastostad*
- *Giasemin*
- *Lansorazol*
- *Lansprazole*
- *Lanrec*
- *Lantil*
- *Lanvone*
- *Losec*
- *Nexium*
- *Omeprazol*
- *Pantoprazol*
- *Pantoprazole*
- *Pantoloc*
- *Panzor*
- *Pariet*
- *Zolt*
- *Pylorid*
- *Somac*

• **12 timmar**

- *Alsucral*
- *Antepsin*
- *Arthrotec*
- *Balancid*
- *Buscopan*
- *Cimex*
- *Cytotec*
- *Doryl*
- *Egazil*
- *Elosan*
- *Esofex*
- *Famotidin*
- *Gaviscon*
- *Inside*
- *Link*
- *Librax*
- *Magnesiama
to*
- *Mestinon*
- *Metopram*
- *Motilium*
- *Mucaine*
- *Nizax*
- *Novaluzid*
- *PeeHoo*
- *Pepcid*

- *Pepsid duo*
- *Pepcidin*
- *PH maxi*
- *Prepulsid*
- *Primperan*
- *Ranil*
- *Ranicur*
- *Ranimex*
- *Ranimil*
- *Ranitide*
- *Ranitidin*
- *Ranisan*
- *Ranixal*
- *Refluxin*
- *Rennie*
- *Succosa*
- *Topalkan*
- *Ubretid*
- *Urecholine*
- *Zantac*

Mahan tyhjenemiseen vaikuttavia lääkkeitä on vältettävä 2 vuorokautta ennen tutkimusta. Mikäli käytät verenpaine- ja sydänlääkkeitä voit ottaa ne normaalisti.

Tervetuloa!

päiv. 07.07.2011