

IVUS (intravaskulaarinen ultraääni)

Tutkimuksen tarkoitus:

IVUS = tutkitaan sepelvaltimoita sisäpuolelta ultraäänen avulla, mikäli varjoainekuvaus (koronaariangiografia) ei anna tarpeeksi informaatiota ahtaumasta.

Ennen tutkimusta:

Lievä nuhaisuus ei estä tutkimusta mutta kuumeen ja/tai yskän tai kovan flunssan iskiessä juuri ennen tutkimuspäivää ilmoita asiasta sydänasemalle, puh. 323 2625.

Mikäli olet aikaisemmin saanut varjoainereaktion tai sinulla on jodiallergia, ota silloin yhteyttä sydänasemalle.

Valmistelut kotona:

Antikoagulanttihoito (Marevan) pidetään tauolla 3 vuorokautta ennen tutkimusta. Tämä ei koske läppäleikattuja potilaita.

Tutkimuspäivän aamuna saat **syödä** kevyen aamiaisen, esim. puuroa, viiliä, velliä, jogurttia (ei voileipää tai hedelmiä). Saat myös juoda kahvia tai teetä. Ota aamulääkkeesi tavalliseen tapaan jos muuta ei ole määrätty. Mikäli sinulla oli lääkkeitä tauolla ennen koronaariangiografiaa, samat lääkkeet ovat myös tauolla ennen IVUS-tutkimusta.

Lääketauot : _____

Tutkimuksen kulku:

Paikallispuudutuksen jälkeen laitetaan kanyyli joko nivus- tai rannevaltimeen. Tämän jälkeen katetri kuljetetaan kanyylin kautta sepelvaltimon suulle ja sen läpi viedään IVUS-katetri tutkittavaan sepelvaltimeen. Tutkimus on kivuton ja tulos katsotaan ja analysoidaan heti.

Uloskirjoitus:

Mikäli IVUS-tutkimuksen jälkeen tehdään heti pallolaajennus, jäät yöksi sairaalaan. Muussa tapauksessa pääset kotiin mahdollisesti jo samana iltapäivänä tai iltana.

Tutkimuksen jälkeen et saa itse ajaa autolla kotiin.

Pyydettyä saat edestakaisen matkatodistuksen.

Jatkohoito:

Jos tutkimus on tehty nivusen kautta on toimenpiteen jälkeen kotona noin viiden vuorokauden ajan syytä välttää raskaiden taakkojen nostamista, pyöräilyä, uintia, kuumia löylyjä saunassa ja kuumia kylpyjä. Jos tutkimus on tehty ranteen kautta riittää ylläolevan välttäminen seuraavaan päivään. Jos pistokohdassa esiintyy jälkivaivoja, ota yhteys sydänasemalle.

Yhteystiedot:

Sydänasema, puhelinnumero 323 2625.