

Valmistautuminen rytminsiirtoon eli kardioversioon

Teidät on laitettu jonoon rytminsiirtoa varten, eli teidän sydämenne rytmi tullaan kääntämään sähköiskun avulla normaaliin rytmiin.

Jotta toimenpiteeseen liittyvät riskit saadaan mahdollisimman vähäisiksi, vaikutetaan veren hyytymismekanismiin Marevan-nimisellä lääkkeellä.

Marevan-lääkityksen alussa seurataan hyytymistekijäarvoa noin kahdesti viikossa, myöhemmin kerran viikossa. Laboratorionäytteen tutkimusnimi on INR. Tavoiteltava hoitotaso on välillä 2-3.

Rytminiirto voidaan suorittaa vasta kun INR on ollut hoitotasolla yhtäjaksoisesti 3-4 viikkoa (edellyttäen että INR-arvo on mitattu kerran viikossa). Laboratoriokokeet (INR) tehdään kotipaikkakuntanne terveystieteiden keskuksessa ilmaiseksi.

Sisätautiinpoliikklinikka kutsuu teidät kokeisiin ja hoitajan vastaanotolle sekä mahdollisesti lääkärinvastaanotolle ennen rytminsiirtoa.

Jos teillä on kysyttävää, neuvomme teitä ottamaan yhteyttä sisätautiinpoliikklinikalle, kardioversiohoitajaan 323 2633, tai kansliaan 323 2632.