

Kohdun kaulankanavan suun höyläys (konisaatio)

Kohdun kaulankanavan suun höyläys eli konisaatio tehdään **solumuutosten poistamiseksi tai diagnoosiin pääsemiseksi.**

Toimenpide

Toimenpide tehdään **nukutuksessa tai paikallispuudutuksessa.** Toimenpiteessä kohdun kaulakanavasta poistetaan polttavalla silmukalla tai veitsellä kartion muotoinen pala näytteeksi.

Toipuminen

Toimenpiteestä ja puudutuksesta toipumiseen osastolla menee muutama tunti. Sairausloman ajan tulee välttää raskaita töitä. Tulehdusriskin vuoksi vuodon (1-2 viikon) ajan tulee välttää yhdyntää, uintia, ammekylpyä ja tampoonien käyttöä. Riittävän usein tapahtuva alapesu ja siteen vaihto ovat suositeltavia.

Kivunhoito

Kotona kivunhoidoksi riittävät yleensä ilman reseptiä saatavat kipulääkkeet.

Parasetamoli

Tulehduskipulääke

Vahva kipulääke

Muut lääkkeet

Jälkitarkastus Vastaus näytteistä ilmoitetaan kirjeellä tai tarkastus voidaan sopia naistentautien poliklinikalle. Seuraava PAPA otetaan gynekologian poliklinikalla n. kuukauden kuluttua.

Sairausloma on toimenpiteestä riippuen 1-2 päivää.

Yhteydenotot

Jos esiintyy tulehdusoireita (kuumetta, kovia kipuja, pahanhajuista vuotoa) tai jos vuoto on runsasta tai jatkuu yli 2 viikkoa, tulee ottaa yhteys omaan terveyskeskukseen tai työterveyshuoltoon.

Naistentautien pkl arkisin klo 14.00 - 15.00 puh. **(06) 323 2012,**

Naistentautien osasto A5 muuna aikana puh. **(06) 323 2092** tai

Päiväkirurginen yksikkö A2 arkisin klo. 7.00 - 17.00 puh. **(06) 323 1552**

Toivotamme hyvää toipumista!