

Laparoskooppisesti tehty tutkimus

Tutkimus **tehdään yleensä kipujen ja/tai lapsettomuuden syyn selvittämiseksi.**

Toimenpide

Toimenpide tehdään **nukutuksessa tähystysleikkauksena** muutaman pienen ihoviillon kautta. Pikkulantion ja usein myös vatsaontelon tilannetta tarkastellaan tähystysinstrumentin kautta. Lapsettomuuden syyn selvittämiseksi voidaan ruiskuttaa väriainetta alakautta kohtuun ja näin saadaan selvyttä munatorvien aukiolosta. Toimenpide kestää noin 30 minuuttia. Toimenpiteestä ja nukutuksesta toipumiseen menee osastolla keskimäärin 4-6 tuntia.

Haavanhoito

Haavoissa on **itsestään sulavat ompeleet**, joita ei tarvitse poistaa. Vuorokauden kuluttua leikkauksesta saa mennä suihkuun. Taitokset poistetaan haavoilta ennen suihkuun menoa. Saunaan voi mennä viikon kuluttua, kun haavat ovat parantuneet ja uimaan ja ammekylpyyn 2 viikon kuluttua toimenpiteestä.

Sairausloman aikana tulee välttää raskaita töitä. Yhdyntää tulee välttää niin kauan kuin vuotoa esiintyy.

Kivunhoito

Kotona kivun hoitoon riittävät yleensä ilman reseptiä saatavat kipulääkkeet. Toimenpiteen jälkeen voi esiintyä pistosta hartiassa tai kylkikaarissa ylävatsalla. Tuntemukset häviävät parissa päivässä. Liikkuminen ja tarvittaessa särkylääkkeet auttavat.

Parasetamoli

Tulehduskipulääke

Vahva kipulääke

Muut lääkkeet

Sairausloma on 3 päivää.

Jälkitarkastus sovitaan tarvittaessa naistentautien poliklinikalle tai joskus lähettävälle lääkärille.

Yhteydenotot

Jos esiintyy tulehdusoireita (punoitusta, turvotusta, jatkuvaa haavaeritystä, kuumetta) tai jos vuoto jatkuu yli 10 päivää, tulee ottaa yhteys omaan terveyskeskukseen tai työterveysshuoltoon.

Naistentautien pkl arkisin klo 14.00 - 15.00 **(06) 323 2012**,
Naistentautien osasto A5 muuna aikana puh. **(06) 323 2092** tai
Päiväkirurginen yksikkö A2 arkisin klo. 07.00 - 17.00 puh. **(06) 323 1552**

Toivotamme hyvää toipumista!