

Lapsen piilokivesleikkaus

Kives kehittyy sikiöaikana vatsaontelon takana lähellä munuaista. Raskausajan loppupuolella se vähitellen laskeutuu normaalipaikalleen. Osittaista laskeutumista tapahtuu vielä syntymän jälkeenkin. **Laskeutumattomassa kiveksessä siittiöiden tuottaminen häiriintyy liian korkean lämpötilan takia, mistä syystä leikkaus on tarpeellinen.**

Toimenpide

Nukutuksessa tehtävässä leikkauksessa vapautetaan siemenjohdinta ja kireällä olevaa kiveksen verisuonijuostetta niin, että kives pystytään vetämään kivespussiin. Leikkauksen jälkeen lapsella on nivustaipeessa noin 3-4 cm mittainen haava sekä kivespussissa toinen noin 1 cm mittainen haava.

Kivunhoito

Leikkauksen loppuvaiheessa haavan seutuun laitetaan paikallispuuduteainetta, joka vähentää leikkauksen jälkeistä kipua. Haavakipua esiintyy muutaman päivän ajan. **Lapselle tulee antaa parina ensimmäisenä päivänä leikkauksesta säännöllisesti kipulääkettä esim.**

Parasetamoli

Tulehduskipulääke

Haavanhoito

Leikkauksessa **käytetään sulavia ompeleita, joita ei tarvitse poistaa.** Suihkuun lapsi saa mennä vuorokauden, saunaan viikon kuluttua leikkauksesta. Käyttäkää lapsella väljiä vaatteita ja vaihtakaa vaippaikäisen vaippa riittävän usein, jotta haava-alueen hankaus jää mahdollisimman vähäiseksi. Leikkauksen jälkeen leikkausalueella, varsinkin kiveksen seudussa saattaa esiintyä turvotusta ja mustelmaa.

Toipuminen

Leikkauspäivänä lapsi tarvitsee lepoa ja aikuisen valvontaa. Lapsi saa liikkua kivun sallimissa rajoissa. **Päivähoitoon lapsi voi mennä 3-4 vrk kuluttua.**

Yhteydenotto

Mikäli paranemisessa esiintyy ongelmia, ottakaa yhteyttä:
Päiväkirurgiseen yksikköön A2 arkisin klo. 07.00 - 17.00 puh. **(06) 323 1552**
Päivystyspoliklinikalle muuna aikana puh. **(06) 323 1311**
Terveyskeskukseen tai neuvolaan

Toivotamme hyvää toipumista!