

## Tärykalvopaikkaus (myringoplastia) - kotihoito-ohjeet

### Miksi leikataan

Tärykalvon reikä, joka aiheuttaa alentuneen kuulon.

### Yleistä leikkauksesta

Toimenpide tehdään paikallispuudutuksessa tai narkoosissa. Haava tulee korvakäytävän eteen tai korvan taakse. Leikkauksessa korvakäytävään laitetaan tamponoja.

Leikkauksen jälkeen korvasta voi tulla verensekaista eritettä. Myös tilapäistä huimausta ja särkyä voi esiintyä.

Tamponit ja tikit poistetaan korvapoliklinikalla 7 päivää leikkauksen jälkeen ja korvakäytävään laitetaan suojaavaa antibioottisalvaa. Salva poistetaan noin 2 viikon kuluttua ja kuulo tarkistetaan ensimmäisen kerran noin 1 kuukauden kuluttua leikkauksesta.

Lapsilta tamponit poistetaan kevyessä narkoosissa päiväkirurgisella osastolla.

### Sairaalassaoloaika

Toimenpide tehdään yleensä päiväkirurgisesti eli sairaalaan tullaan aamulla ja iltapäivällä voi lähteä kotiin. Mikäli toimenpide tehdään vuodeosaston kautta, jääetään sairaalaan yön yli.

### Hoito-ohjeet leikkauksen jälkeen

- korva täytyy ehdottomasti suojata vedeltä (hiukset saa pestä vasta viikko leikkauksen jälkeen)
- välttää niistämistä
- aivastaessasi älä tuki nenää, koska silloin välikorvan paine kasvaa ja tärykalvopaikka voi irrota
- korva suojataan siteellä ensimmäiseen poliklinikakäyntiin saakka
- sairasloman (n. 2-3 viikkoa) ajan tulee voimakasta räsytystä ja saunomista välttää
- lentomatkoista tulee keskustella lääkärin kanssa
- lapsen tulee olla poissa koulusta viikko leikkauksen jälkeen

### Kivunhoito

Kipulääkkeitä olisi hyvä ottaa säännöllisesti 1-4 vrk:n ajan ja sen jälkeen tarvittaessa.

Parasetamoli

---

Tulehduskipulääke

---

### Ota yhteyttä sairaalaan/lääkäriin

Jos särky lisääntyy tai sinulle tulee kuumetta tai jos huimaus pahenee, ota yhteys:  
korvapoliklinikka arkisin klo 7-15 puh. 06-323 1372, päiväkirurginen yksikkö A2 arkisin klo 7-17 puh. 06-323 1552 ja muina aikoina päivystyspoliklinikka 06-323 1311

Hyvää vointia!