



## Erotusdiagnostiikka

- Huomioi muiden taustatekijöiden mahdollisuus, esim. fibromyalgia, lihasten kiinnityskohtien tulehdukset, jännetulehdukset, nivelreuma, laaja kipusyndrooma, selkäperäiset syyt (hermopinne välilevyistä, fasettinivelistä, spinaalisten oosista johtuen), paikalliset hermovammat (inguinaalihermo/lonkka, saphenusherma/polvi) jne.
- Lonkkanivelrikossa kipu voi säteillä polveen!
- **Laboratoriotutkimukset** tulehduksellisen reumasairauden poissulkemiseksi tulee ottaa silloin kun nivel on turvonnut.
  - Lasko, CRP ja pvk
  - reumatekijää ei tutkita, ellei kyseessä ole useamman nivelen tulehdus
  - nivelnesteanalyysi aina, jos nivelnestettä punktoitavaksi:
    - leukosyytit ( $> 2000 \times 10^6/l$  viittaa nivel tulehdukseen)
    - tutki kiteet
    - nivelneste gram-värijäys ja viljely jos samea nivelneste ja epäily bakteriellista nivel tulehduksesta (samea nivelneste viittaa korkeaan leukosyyttimäärään)

Huomio potilas, jolla on nivelrikko ja hän sairastuu myöhemmällä iällä nivelreumaan, koska nivelen tuhoutuminen etenee poikkeuksellisen nopeasti!

Lonkan ja polven nivelrikko 13.10.2014/pw